



Ersttrimester-Screening

Mittels Ultraschall kann in der 10.-14. Schwangerschaftswoche die Nackentransparenz beim Fetus beurteilt werden.

Spezielle Computerprogramme errechnen dann aus der Nackentransparenz, der Schwangerschaftswoche, der Scheitel-Steiß-Länge, dem BIP (von Schläfe zu Schläfe) und dem Alter der Mutter das individuelle Risiko für eine Fehlbildung.

Durch die Kombination mit Laboruntersuchungen – Messung des Schwangerschaftshormons freies β -HCG und des Schwangerschaftsproteins PAPP-A – kann die Genauigkeit des Tests noch verbessert werden.

Die Ersttrimester-Diagnostik ist besonders wichtig für Schwangere mit folgenden Risiken

- Alter über 35 Jahre
- Kind mit Down-Syndrom in der Familie
- Kind mit Herzfehler in der Familie
- Mehrlingsschwangerschaften
- Diabetes mellitus
- Schwangerschaftsdiabetes
- Mütterliche Stoffwechselerkrankungen
- Drogen- und Medikamenteneinnahme
- Rauchen
- Alkoholabusus
- Infektionen oder Röntgenuntersuchungen in der frühen Schwangerschaft
- Chemikalienkontakt
- Ehen innerhalb der Verwandtschaft

Ihr Nutzen

Die Ersttrimester-Diagnostik bietet Ihnen **frühzeitige Hinweise auf eine mögliche Fehlbildung.**